中　醫　中　藥　學

義守大學 學士後中醫學系
蔡汎修、林立偉

各論

第一章 解表藥
第二章 清熱藥
第三章 瀉下藥
第四章 祛風濕藥
第五章 芳香化濕藥
第六章 利水滲濕藥
第七章 溫裏藥
第八章 理氣藥

第九章 消食藥
第十章 驅蟲藥
第十一章 止血藥
第十二章 活血祛瘀藥
第十三章 化痰止咳平喘藥
第十四章 安神藥
第十五章 平肝息風藥
第十六章 開竅藥

第十七章 補虛藥
第十八章 收澀藥
第十九章 湧吐藥
第二十章 外用藥

第十九章 湧吐藥

前言

- 定義
  - 凡以促使嘔吐為主要作用的藥物，叫湧吐藥，又稱催吐藥。
    - 《內經》“在上者湧之，是指人體上部(如咽喉、胸脘)有毒物、宿食、痰涎等，均可應用催吐法，以達到祛邪治病的目的。
    - 故凡誤食毒物，停留胃中，未被吸收;或宿食停滯不化，堵塞胃脘，尚未入腸，脘部脹滿疼痛;或痰涎壅盛，阻礙呼吸;以及癲癇發狂等證，均可使用湧吐藥來治療。

- 功效
  - 湧吐藥作用峻猛，大都具有毒性，且嘔吐是劇烈的動作，可以影響內臟，易傷正氣，如使用不當，能令患者產生不良後果，故湧吐藥只適用於氣壯邪實之證，如體質虛弱或老人、小兒、婦女胎前產後，以及素患失血、頭眩、心悸、勞嗽喘咳者均忌用。
- 注意事項
  - 使用湧吐藥時，還當注意用量、用法和解救之法。一般服用湧吐藥，宜從小量開始，逐漸增加劑量的方法，中病即止，以防中毒或湧吐太過;且服藥後，宜多飲熱開水，以助藥力
    - 藜蘆吐者，不止，以蔥白湯解之
    - 石藥吐者，不止，以甘草、貫眾解之
    - 諸草木吐者，可以麝香解之

瓜蒂

- 【來源】為葫蘆科一年生質藤本甜瓜 Cucumis nelo L.的果蒂。
- 【性味歸經】苦，寒;有毒。歸胃經。
- 【功效】內服湧吐熱痰、宿食;外用研末吹鼻，可引去濕熱。

0
1cm

常山

- 【來源】本品係虎耳草科植物黃常山 *Dichroa febrifuga* Lour.的根。
- 【別名】蜀漆。
  - 即常山的嫩枝葉。性味、歸經、功效、應用與常山略同，而湧吐之力較常山 強

常山{雞骨}(圓柱波狀曲扭,棕黃,皺紋,外皮易落體質堅)

膽礬

- 【來源】本品為硫酸鹽類礦物膽礬Chalcanthite的晶體，或為人工製成的含水硫酸銅($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)。
  - 《神農本草經》礬石
- 【性味與歸經】
  - 酸、辛，寒;有毒。歸肝、膽經。
- 【功效】內服，湧吐風痰、毒物;外用，解毒收濕，蝕瘡去腐。催吐、解毒藥。用於：
  - 風痰壅塞，喉痛痰多，癲癲 。
  - 外用治口瘡，風眼，痔瘡、疥癬。



膽礬 (塊狀結晶體,深藍,半透明,玻璃光澤,澀)

藜蘆

- 【來源】本品係百合科植物
  - 藜蘆*Veratrum nigrum* L.的根及根莖。
  - 白藜蘆 *Veratrum album*
- 【性味與歸經】辛、苦，寒;有毒。歸肺、胃、肝經。
- 【功效】湧吐風痰，殺蟲。祛痰、催吐、殺蟲藥。用於：
  - 中風痰壅不吐，風癇癲疾。
  - 疥癬、惡瘡。
  - 頭痛，喉痹，鼻息。

蔡蘆{穿簑衣}

藜蘆

藜蘆片